

ANEXO 1

Razón de Mortalidad Materna. 2012-2016

	2016 / 1	2015	2014	2013	2012
Estados Unidos Mexicanos	33.9	34.6	38.9	38.2	42.3
Aguascalientes	25.9	25.8	22.1	25.7	47.7
Baja California	28.3	32.0	28.9	42.3	31.0
Baja California Sur	16.6	24.3	15.9	32.1	23.3
Campeche	44.1	46.5	18.0	65.4	42.8
Coahuila de Zaragoza	30.7	28.3	37.0	27.0	34.4
Colima	29.2	22.3	29.4	22.5	23.6
Chiapas	52.9	68.5	68.1	54.8	60.6
Chihuahua	33.3	43.1	56.5	59.8	46.7
Ciudad de Mexico	33.3	44.3	41.9	41.9	40.1
Durango	42.9	31.1	71.2	41.2	52.5
Guanajuato	27.1	31.2	27.7	34.9	34.8
Guerrero	44.2	49.5	58.7	59.4	75.9
Hidalgo	49.0	32.3	65.5	37.5	37.8
Jalisco	33.3	24.7	34.4	22.4	23.4
Mexico	36.5	30.9	33.9	36.1	42.7
Michoacan de Ocampo	25.2	34.3	47.7	36.7	41.7
Morelos	28.1	36.6	9.1	44.5	39.0
Nayarit	35.4	66.9	28.5	36.1	45.5
Nuevo Leon	38.5	23.5	17.6	14.8	26.6
Oaxaca	32.3	48.6	46.7	50.4	65.3
Puebla	34.3	32.3	37.6	31.8	50.6
Queretaro	35.3	14.9	34.5	35.0	19.8
Quintana Roo	38.8	20.7	27.8	46.2	50.4
San Luis Potosi	31.9	30.1	24.1	31.8	40.7
Sinaloa	34.8	22.1	31.4	26.7	41.5
Sonora	49.3	32.2	33.7	40.2	33.2
Tabasco	23.5	41.7	40.7	27.4	34.2
Tamaulipas	29.7	32.0	28.5	41.7	26.0
Tlaxcala	33.1	20.1	51.4	23.2	59.4
Veracruz de Ignacio de la Llave	25.7	29.9	43.4	46.4	51.0
Yucatan	5.0	32.6	42.4	50.8	50.1
Zacatecas	19.6	32.6	32.5	44.2	32.0

Fuente: SS. Dirección General de Información en Salud de

1/ preliminares con cifras definitivas de la Dirección General de Epidemiología de la notificación inmediata de muertes maternas al cierre de diciembre de 2016 y los nacidos vivos con base en la Metodología de la DGIS.

